



**Caso necessite de esclarecer
dúvidas ou alterar a marcação
da administração da vacina,
pode contactar o enfermeiro
no serviço de Consulta Externa
Tlf. 252 300 800 Ext. 2823 / 2218**



SNS SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE



Vacinas

**Orientações a seguir
durante o tratamento
com a administração
de extratos alergénios**

Unidade de Santo Tirso

Tel. 252 830 700 | **Fax.** 252 858 986

Morada: Largo Domingos Moreira
4780-371 Santo Tirso

Unidade de Famalicão

Tel. 252 300 800 | **Fax.** 252 312 963

Morada: Rua Cupertino de Miranda s/n
Apartado 31 4761-917 V.N.Famalicão



CHMA

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.

Recomendações relativas à vacina:

A vacina deve ser guardada na gaveta do frigorífico.

Quando se deslocar ao hospital para a administração da vacina, esta deve ser transportada em mala térmica com um acumulador de frio.

Não deve esquecer-se de solicitar atempadamente ao médico o reforço da vacina, pois o tratamento não pode ser interrompido.

No dia da administração da vacina:

Se for criança, esta deve ser acompanhada por um adulto. Deve trazer roupa que proteja o braço onde é administrada a vacina. Informar o enfermeiro se:

- estiver a tomar antibiótico
- com febre
- lhe tiver sido administrada outro tipo de vacina recentemente
- manifestar sintomas intensos da sua doença alérgica
- tiver sido submetido a cirurgia recente ou extração dentária

Após a administração da vacina vai aguardar 30 min na sala de espera.

Posteriormente será reavaliada pelo enfermeiro e observado o local de administração da vacina.

Antes de abandonar o serviço de Consulta Externa, deve dirigir-se ao balcão de atendimento administrativo.

Esta vacina tem como objetivo criar tolerância imunológica, fazendo com que o organismo reaja menos ou deixe de reagir àquilo a que é alérgico, através da administração de alérgenos específicos (ácaros, gramíneas, bolores...) durante um período de 3 a 5 anos.



Em casa:

Não pressionar o local de administração da vacina.

Não fazer exercício ou esforço físico nas 12h seguintes à administração da vacina.

Se no local da administração da vacina observar uma reação tipo “pápula”, deve aplicar frio.

Se apresentar queixas fora do habitual, nomeadamente sintomas de “falta de ar” deve dirigir-se ao serviço de Urgência.